

Kiła – przyczyny, objawy i leczenie

Spis treści:

1. [Informacje ogólne](#)
2. [Przyczyny](#)
3. [Objawy](#)
4. [Leczenie](#)

1. Informacje ogólne – co to jest kiła?

Kiła (inaczej syfilis, syf, weneria) należy do układowych chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową. Bakteria która wywołuje kiłę – krętek błady (*Treponema pallidum*) – dostaje się do organizmu przez skórę lub błony śluzowe. Namnaża się i przenosi przez układ krwionośny. Kiła narządów płciowych jest chorobą weneryczną i znana jest od czasów renesansu.

2. Kiła – przyczyny

Jak można się zarazić kiłą? Najłatwiej przez bezpośredni kontakt z zakażonymi wydzielinami podczas stosunku seksualnego i pocałunku. Ponieważ *Treponema pallidum* nie przenosi się drogą kropelkową, codzienne kontakty z osobą zarażoną nie stanowią zagrożenia. Nie zarazimy się kiłą na basenie, korzystając z tej samej zastawy stołowej ani przez podanie ręki.

3. Kiła – objawy

Kiła – pierwsze objawy

Pierwsze objawy kiły są widoczne po około 3 tygodniach. Nie jest to jednak regułą, ponieważ objawy zakażenia kiłą mogą nie występować nawet przez kilkadziesiąt lat. Syfilis objawy ma różne, ale najczęściej rozpoczynające się od wysypki.

Kiła – zdjęcia (syfilis – zdjęcia)



Jak wygląda kiła? Zdjęcia ukazują po kolei etapy choroby.

Pierwszy objaw syfilis to zazwyczaj grudki. Zmiany te powstają na całym ciele, w umiarkowanej ilości i utrzymują się do kilku tygodni. Zazwyczaj pacjenci zakażeni krętkiem białym nie są świadomi, że to kiła. Choroba ta ma niepozorne objawy.


Kiła – zdjęcia wysypki



Owrzodzenia powstałe z grudek mogą potwierdzić, że to kiła.

Wysypka owrzodzona ma kształt owalny lub okrągły, lśniąca brzegi, a dno pokryte jest niewielką ilością wydzieliny. Taki stan może trwać nawet do kilkunastu miesięcy. Czasem bywa, że objawy kiły zanikają samoistnie.

Kiła – objawy skórne (zdjęcia)



Kiła u mężczyzn występuje częściej niż u kobiet. U zakażonych mężczyzn wrzody pojawiają się w okolicach intymnych, takich jak moszna, prącie, a także odbył (w przypadku homoseksualistów). Często z miejsc owrzodzonych wydobywa się przezroczysta wydzielina. Ponadto, obserwuje się zmiany na skórze ciała, szczególnie rąk. Towarzyszy temu ból gardła, spadek wagi, osłabienie. U każdego mężczyzny objawy mogą być inne i w różnym nasileniu, w zależności od indywidualnych cech organizmu i stopnia zakażenia. Kiła objawy u mężczyzn posiada więc dość zróżnicowane.

Kiła – objawy u mężczyzn (zdjęcia)

Czasami pacjenci nie są pewni, czy ich dolegliwości na skórze to kiła. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Każdy przypadek jest różny. Po wystąpieniu objawów należy niezwłocznie udać się do lekarza wenerologa.



4. Kiła – leczenie

Aby rozpocząć kurację, należy mieć 100% pewność, że to kiła. Badanie polega na wykonaniu testu PCR. Jest to badanie bezbolesne. Metoda PCR pozwala na wykrycie bakterii *Treponema pallidum*, a tym samym potwierdzenie, że dolegliwość która nas spotkała to kiła. Leki stosowane w zwalczeniu tej choroby opierają się na antybiotykach i jest to zazwyczaj penicylina, doksycyklina i tetracyklina. Antybiotyki wstrzykuje się domięśniowo przez okres minimum dwóch tygodni.

Źródła:

1. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2016/index_mp.html
2. Kiła; Ewa Wojdała; Czelej Wydawnictwo, Lublin 2018, wyd.1; ISBN: 978-83-7563-261-3
3. Syfilis (Kiła, przymiot): Przystępnie dla ogółu ; Przekład z niemieckiego, Biblioteka okregowego związku kas chorych w Krakowie „Poradnia lekarska”; Paul Orłowski; Nakł. okregowego związku kas chorych, 1926
4. Choroby przenoszone drogą płciową; Tomasz F. Mroczkowski; PZWL Wydawnictwo, Warszawa 1998, wyd.1; ISBN: 83-200-2152-9