Bolesny wzwód – bolesna erekcja

Życie seksualne każdego mężczyzny może ulec znaczącemu pogorszeniu, jeśli pojawi się u niego dolegliwość znana jako priapizm, czyli bolesny wzwód członka. Oczywiście, dolegliwość taka może wpłynąć bezpośrednio na komfort jego życia, prowadząc nie tylko do przykrych podrażnień prącia, lecz również i do pogorszenia stosunków z partnerką. To również duże utrudnienie dla codziennego funkcjonowania, ponieważ wzwód może trwać bardzo długo i cały czas powodować przykre dolegliwości. Nie ma jednocześnie związku z odczuwanym podnieceniem seksualnym – a wręcz sprawia, że staje się ono przykre. Dolegliwość ta jest dosyć powszechna i może dotyczyć wielu mężczyzn. Ponieważ rzutuje na całe ich życie i jest spowodowana nieprawidłowościami zdrowotnymi (w temacie: bolący wzwód), należy szybko zgłosić się z nią do lekarza specjalisty. Warto wiedzieć, że bolesny wzwód prącia może wynikać między innymi z zarażenia się chorobami wenerycznymi! Co warto wiedzieć na ten temat?

Gdy erekcja boli

Bolesny wzwód jest dolegliwością wstydliwą, ale należy szybko się przemóc i zgłosić do specjalisty – może bowiem mieć wiele przykrych konsekwencji. Jeśli nie zostanie w porę zażegnana, może doprowadzić między innymi do trwałego uszkodzenia tkanki. W konsekwencji może to

wszystko prowadzić do niepłodności, trudności z osiągnięciem i utrzymaniem erekcji w późniejszym czasie i obumarcia tkanek.
Specjaliści dzielą podobną dolegliwość na 2 różne grupy, ze względu na to czym może być ona spowodowana:

- wysokim przepływem krwi (przekrwienny),
- o niskim przepływie (niedokrwienny).

Bolesny wzwód – diagnoza

Szybkie zgłoszenie się do lekarza sprawia, że leczenie zostaje podjęte w odpowiednio wczesnym momencie. Dzięki temu szanse na prędkie wyzdrowienie są bardzo duże. Wszystko jednak zależy od tego, **czym dokładnie spowodowana jest bolesna erekcja**. Powodów może być wiele, a jednym z nich może być ukryta choroba weneryczna.
Żeby ocenić podłoże dolegliwości oraz pomóc w zażegnaniu problemu, konieczne jest przeprowadzenie stosownych badań. Lekarz bada członek, podbrzusze oraz odbyt. Od pacjenta pobierana jest również krew do badań. Pacjent otrzymuje również stosowne leki (adrenominetyki), które pomagają w pozbyciu się problemu. Zalegającą krew usuwa się przy pomocy strzykawki. Czasem potrzebna jest również ingerencja chirurgiczna. Leczenie polega także na przepłukaniu ciał jamistych solą fizjologiczną.

Testy PCR a diagnoza

Testy PCR są wygodnym sposobem na przeprowadzenie stosownych badań we własnym domu. W ten sposób można postawić diagnozę jeszcze przed konsultacją z lekarzem. Ma to duże znaczenie dla osób, które są seksualnie aktywne, a jednocześnie wstydzą się

posądzenia o chorobę weneryczną. Testy są na tyle proste, że każdy z łatwością je wykona. Z drugiej strony są jednak wyjątkowo czułe i wykryją chorobę na podstawie już jednego patogenu. Dlatego można im wierzyć.

Już jeden nieodpowiedzialny stosunek może skutkować zarażeniem. Niewiedza może zaś sprawić, że zarazimy kolejne osoby. Dlatego osoby aktywne seksualnie, którym choć raz zdarzył się stosunek bez prezerwatywy, albo też, które choć raz spały z kimś ledwo poznanym, powinny przeprowadzić badania w kierunku obecności drobnoustrojów przenoszonych drogą płciową. Tym bardziej, gdy pojawiają się u nich takie niepokojące objawy jak bolesny wzwód.