

Parcie na pęcherz – parcie na mocz



Organizm człowieka jest niesamowicie złożony i wszelkie jednostki chorobowe mogą mieć swoje źródło w bardzo oczywistych i mniej oczywistych kwestiach. Są i takie objawy, których nigdy byśmy nie połączyli na przykład z chorobą weneryczną, a jednak mogą bezpośrednio na nią wskazywać i stanowić na przykład jedyny sposób jej ukazania się. Parcie na mocz mało kto uznałby za objaw choroby przenoszonej drogą płciową, a jednak może być właśnie jej efektem. Zwłaszcza więc obecnie, gdy tak wiele osób uprawia seks bez zabezpieczenia prezerwatywą i gdy zmienia się partnerów seksualnych częściej niż kiedyś, należy obawiać się chorób wenerycznych i badać się na ich obecność w sposób systematyczny. Ciągłe parcie na mocz może wskazywać na chorobę weneryczną – więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części artykułu!

Parcie na pęcherz – przyczyny

Ciągłe parcie na pęcherz może być spowodowane różnymi czynnikami. Zwykle uważa się, że to oznaka przewianego, przemarznętego pęcherza moczowego i rzeczywiście może tak być. Ale w wielu przypadkach choć nie łączy się tego objawu bezpośrednio z chorobą weneryczną, właśnie na nią on wskazuje. Bywa że to jedyny widoczny objaw, ponieważ wiele chorób tego typu rozwija się niemal bezobjawowo, więc każdy myśli, że jest zdrowy. To bardzo groźne dla zdrowia swojego i innych, ponieważ można dalej zarażać.

Uczucie parcia na pęcherz – jeśli utrzymuje się przez dłuższy

czas – może wskazywać na następujące choroby przenoszone drogą płciową:



- Rzeżączka
- Rzęsistkowica
- Chłamydioza
- Zakażenie Ureaplasma
- Zakażenie Mycoplasma
- [Bakteryjne zakażenie pochwy/ bakteryjna waginoza](#)
- Zakażenie Streptococcus agalactiae
- Drożdżyca – Kandydoza
- Opryszczka – wirus HSV.

Parcie na pęcherz a choroby weneryczne

Parcie na pęcherz może wskazywać na istnienie w organizmie drobnoustrojów przenoszonych drogą płciową. Warto wiedzieć jakie inne, ewentualne objawy łączy się z każdą z chorób, żeby móc w porę określić na co chorujemy i przeprowadzić na potwierdzenie kierunkowe testy.

Rzeżączka u kobiet daje następujące objawy:

- bolesne parcie na pęcherz,
- ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
- upławy żółtawe lub z krwią,
- świąd okolic intymnych,
- ból podczas współżycia,
- krwawienie międzymiesiączkowe,
- nudności,

- podwyższona temperatura.

U mężczyzn zaś występują następujące objawy:

- uczucie ucisku na pęcherz,
- ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
- świąd okolic intymnych,
- ropna wydzielina z prącia,
- zapalenie układu moczowego.

U mężczyzn zaś objawy rzęsistkowy są następujące:

- u wielu mężczyzn przebiega bezobjawowo,
- białawe plamienie z cewki moczowej,
- świąd i pieczenie cewki moczowej,
- częstomocz.

Chłamydioza jest chorobą weneryczną, która przez lata może nie pokazywać swojej obecności. Nie zawsze jednak przebiega bezobjawowo. Może się ukazywać w następujący sposób:

- u wielu osób przebiega bezobjawowo,
- ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
- ucisk na pęcherz,
- ból podczas stosunku,
- u kobiet dodatkowo krwawienie z pochwy.

Niezwykle groźne jest też zakażenie bakteriami [Ureaplasma](#) lub [Mycoplasma](#). Te pierwsze mogą dawać następujące objawy chorobowe:



- parcie na mocz,
- pieczenie i kłucie w okolicach cewki moczowej,
- częstomocz,

- wydzielina z cewki moczowej.

W przypadku bakterii Mycoplasma objawy u kobiet to:

- świąd i pieczenie okolic intymnych,
- parcie na mocz,
- obfite upławy,
- krwawienie międzymiesiączkowe,
- ból podczas stosunku,
- ból podbrzusza.

Inne choroby weneryczne – objawy

Zagrożeni jesteśmy również i innymi niż wymienione chorobami wenerycznymi. Kobiety mogą zarazić się bakteryjną waginozą, czyli po prostu złapać bakteryjne zakażenie pochwy. Najczęstsze objawy to:

- świąd okolic intymnych,
- upławy,
- zmiana wyglądu i zapachu wydzieliny z pochwy,
- parcie na pęcherz,
- pieczenie i świąd.

Drożdżyca jest o tyle niebezpieczna, że można się nią zarazić nie tylko przez stosunek seksualny, ale także przez sam kontakt z chorym. Objawy drożdżycy fałdów skórnych (pachwiny, szpara międzypoślądkowa) są następujące:



- świąd,
- łuszczenie się skóry,
- zaczerwienienie,

- pęknięcia skóry,
- pęcherzyki.

Objawy drożdżycy żołędzi, napletka, pochwy i sromu to zaś:

- pieczenie i świąd okolic intymnych,
- parcie na mocz,
- szaro-biały nalot,
- gęste, białe upławy,
- nadżerki.

Parcie na mocz u mężczyzn i kobiet może również wynikać z zarażenia [opryszczką](#). Nie jest to wcale odosobniony przypadek, gdyż większość osób jest zarażona tą chorobą. Wirus opryszczki ma tendencję do nawrotów i wbrew pozorom powinno się go leczyć – choć nie da się go zupełnie usunąć z organizmu. Warto wiedzieć, że może powodować:

- pieczenie, ból i mrowienie miejsc intymnych,
- parcie na mocz,
- pęcherzyk lub pęcherzyki,
- owrzodzenie lub nadżerka,
- wydzielina z pochwy lub prącia,
- gorączka,
- ból mięśni,
- powiększone węzły chłonne.

Diagnostyka chorób wenerycznych

Postawienie diagnozy dotyczącej choroby wenerycznej jest niemal niemożliwe na podstawie samych objawów – zdarza się bowiem, że choroba rozwija się bezobjawowo, albo też daje objawy na długo po tym, jak zostaliśmy nią zarażeni. Szybka diagnoza jest zaś konieczna, jeśli chcemy się skutecznie wyleczyć i nie zarażać innych. Osoby aktywne seksualnie powinny zatem systematycznie się badać i w ten sposób sprawdzać swój stan zdrowia.

Pomocne w tym mogą być testy PCR, które można wykonać we własnym domu i które zapewniają tym samym dyskrecję. Są zaś

bardzo dokładne i pokażą czy nasze podejrzania co do choroby są słuszne, czy też nie.