

Porzeżączkowe zapalenie cewki moczowej



Cewka moczowa to końcowa część układu moczowego, odprowadzająca mocz na zewnątrz. Jej umiejscowienie nie tylko w pobliżu narządów wydalania, ale również i narządów płciowych (lub bezpośrednio na nich, jak to ma miejsce w przypadku panów)

powoduje zwiększoną możliwość występowania różnego rodzaju infekcji i zakażeń. Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej to stan zapalny, w którym nie stwierdza się zakażenia rzeżączką, lecz na przykład chłamydią. W każdym innym przypadku stan zapalny jest wynikiem rozwijającej się w organizmie rzeżączki. Dla wielu osób będzie to zaskakujące – myślą bowiem, że choroby weneryczne do przeszłości! Tymczasem bardzo łatwo się nimi zarazić we współczesnym świecie, dlatego należy bardzo uważać i w porę reagować, gdy dzieje się coś niedobrego. Co warto wiedzieć na temat zapalenia cewki moczowej jednego i drugiego typu?



Zapalenie cewki moczowej – przyczyny

Zapalenie cewki moczowej może mieć różne przyczyny. Specjaliści – jak już wspomniano – dzielą je na zakażenie rzeżączkowe i nierzeżączkowe. W tym pierwszym wypadku powód

wystąpienia infekcji jest oczywisty. W tym drugim zaś może być spowodowany na przykład przez zarażenie następującymi czynnikami chorobotwórczymi:

- [Ureaplasma](#)
- [Mycoplasma genitalium](#)
- Trichomonas vaginalis
- [Wirus opryszczki zwykłej.](#)

Najczęstszym powodem pojawienia się stanu zapalnego u mężczyzn jest zakażenie chłamydiami. Rzadziej zaś odpowiadają za to gronkowce złociste, paciorkowce z grupy B, Gardnerella vaginalis, niektóre beztlenowce oraz Candida albicans.

Zapalenie cewki moczowej – badania i diagnoza

Zakażenie cewki moczowej diagnozuje się na podstawie wywiadu z pacjentem oraz po przeprowadzeniu specjalistycznych testów, które mają za zadanie ustalić konkretną przyczynę wystąpienia choroby.

Wydzielina z cewki moczowej znacząco ułatwia diagnozę, ponieważ jest jednym z charakterystycznych objawów stanu zapalnego. Pojawia się również ból czy [pieczenie przy oddawaniu moczu](#).

Na szczęście narząd reaguje na leczenie antybiotykami, choć udowadnia to że w większości za stanem zapalnym stoi chłamydia i inne bakterie.

Diagnozę można na szczęście postawić też samodzielnie – posługując się testami PCR. W jakim kierunku przeprowadzać testy? Jeśli nie w kierunku rzeżączki, to biorąc pod uwagę następujące choroby przenoszone drogą płciową:



- [Rzęsistkowica](#)
- [Chłamydioza](#)
- [Zakażenie Ureaplasma](#)
- Zakażenie Mycoplasma.

Testy PCR a właściwa diagnoza

Wymaz z cewki moczowej pozwala przeprowadzić badanie mikroskopowe, ustalające przyczynę pojawienia się stanu zapalnego. Badaniu poddaje się wydzielinę barwioną metodą Grama lub błękitem metylenowym, co pozwala określić liczbę leukocytów wielojądrzastych obecnych w niej oraz rodzaj flory bakteryjnej towarzyszący wyciekowi. Choć jednak wyniki otrzymania się w przychodni, badanie pod kątem zakażenia chorobami wenerycznymi można przeprowadzić we własnym domu. Wystarczy zamówić odpowiedni test PCR, a następnie zastosować się do czynności wskazanych na opakowaniu. To bardzo komfortowy i dyskretny sposób – a do tego niedrogi i wyjątkowo precyzyjny!